

Pneumokokken-Impfstoff

Erreger:	Streptococcus pneumpniae, Bakterien
Übertragungsweg:	Tröpfcheninfektion
Inkubationszeit:	Die Inkubationszeit kann nicht genau bestimmt werden, da die Träger der Erreger nicht immer erkranken. Die Inkubationszeit der Pneumokokken-Pneumonie ist kurz, etwa 1-3 Tage
Krankheitsverlauf:	
Immunität nach Erkrankung:	nur gegen den jeweiligen Serotyp
Häufigkeit und Verbreitung:	Weltweite Verbreitung
Impfung empfohlen für:	alle Kinder bis 2 Jahren und Personen >60 Jahre, Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens
Grundimmunisierung:	Für alle Kinder bis 2 Jahren ist die Impfung mit 3 Dosen eines Konjugatimstoff empfohlen
Auffrischimpfung:	Nur bei bestimmten Grunderkrankungen in Erwägung ziehen.



Pneumokokken-Impfstoff

Quellen:

Bilder:

Text:

Bauer, Adrian (2019): Pneumokokken, URL:
<https://www.impfen.de/impfungen/>, Aufruf am 28.07.2020.

Ommen, Oliver (o.J.): Pneumokokken – Impfen bei Kindern, URL:
<https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-kinder-0-12-jahre/pneumokokken.html>, Aufruf am 17.07.2020.

Zimmermann, Melanie (2020): Pneumokokken-Impfung, URL:
<https://www.netdokter.de/impfungen/pneumokokken-impfung/>,
Aufruf am 17.07.2020.

